

Правила подготовки к компьютерной томографии (КТ) органов брюшной полости и малого таза с болюсным контрастным усилением и без него

Правила подготовки к исследованию:

- исключить за день до исследования газообразующие продукты питания;
- самостоятельно произвести предварительное контрастирование полых органов ЖКТ с помощью рентгенконтрастного средства:
 - 20 мл 76% урографина (1 ампула) развести в 1 л воды;
 - 500 мл раствора выпить дробно в течение вечера накануне исследования;
 - 250 мл раствора выпить утром в день исследования (возможен легкий завтрак);
 - 250 мл раствора взять с собой для приема непосредственно перед исследованием.

Для исследования с внутривенным контрастным усилением необходимо:

- 1) отсутствие аллергической реакции на йодсодержащие препараты;
- 2) биохимический анализ крови (уровень креатинина, мочевины) давностью не более 1 недели;
- 3) установленный периферический или центральный венозный катетер.

При наличии КТ-исследований предыдущих этапов наблюдения необходимо представить данные исследования врачу-рентгенологу (предпочтительно на CD/DVD).

Противопоказания к проведению КТ с внутривенным контрастным усилением:

- бронхиальная астма тяжелого течения;
- гипертиреоз;
- сахарный диабет тяжелого течения;
- нефропатия (в том числе миеломная);
- беременность;
- с осторожностью при наличии аллергических реакций в анамнезе (показана консультация аллерголога);
- техническое ограничение — масса тела не более 150 кг.